

Алгоритм 2. ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Степень	Легкая	Средней степени	Пациенты с факторами риска
Клиника	<ul style="list-style-type: none"> - повышение температуры тела до 380С - потеря вкуса и обоняния - жидкий стул - слабость, потливость - ломота в суставах, болезненность в мышцах 	<ul style="list-style-type: none"> - Температура тела выше 380С - Приступообразный кашель - Чувство сдавления в груди - Чувство жжения в груди - Одышка при нагрузке 	<ul style="list-style-type: none"> - Любое повышение температуры - Слабость, потливость, ломота в суставах - Головные боли, жидкий стул - Повышение/понижение давления - Кашель, чувство сдавления в груди - Одышка при физической нагрузке
Наблюдение со стороны МО ПМСП	Смотрите Алгоритм 1	См Алгоритм 1	См Алгоритм 1
Рекомендации по самоконтролю	<ul style="list-style-type: none"> - Оставаться дома - Предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции - Вести дневник самонаблюдения - Дистанционная связь с медработниками МО ПМСП 	<ul style="list-style-type: none"> - Вести дневник самонаблюдения: контроль за частотой дыхания, температурой, усилением одышки - Дистанционная связь с медработником МО ПМСП 	<ul style="list-style-type: none"> - Ведение дневник самоконтроля по основному заболеванию: измерение АД, ЧСС, глюкозы крови, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия) - Ведение дневника самоконтроля по вирусной инфекции
Общие рекомендации	Обильное питье Постельный режим	Обильное питье Постельный режим 5% раствор глюкозы, Ацесоль	Постельный режим, питьевой режим в соответствии с рекомендацией специалиста, Ацесоль в/в кап.
Антикоагулянты	Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг в день	Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг в день	Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг в день Ксарелто 15 мг в день
Антибактериальная терапия	Не назначать	Азитромицин 500 мг 1 таб в день 5 дней. Затем по 250 мг 1 табл в день 5 дней Или Флемоксин солютаб по 500 мг. 2 раза в день 7 дней	Азитромицин 500 мг 1 таб в день 5 дней. Затем по 250 мг 1 табл в день 5 дней ИЛИ Амоксиклав по 500 мг. 2 раза в день ИЛИ Цефиксим 400 г 1 раз в день 7 дней
Противовирусная терапия	Осельтамивир 75 мг 2 раза в день Ингавирин 90 мг 1 раз в день 7 дней	Осельтамивир 75 мг 2 раза в день Ингавирин 90 мг 1 раз в день 7 дней	Осельтамивир 75 мг 2 раза в день Ингавирин 90 мг 1 раз в день 7 дней
Жаропонижающие	Парацетамол, Нимесулид, Ибупфен	Парацетамол, Нимесулид, Ибупфен	Парацетамол, Нимесулид, Ибупфен
От кашля	Ацетилцистеин по 600 мг 2 раза в день	Ацетилцистеин по 600 мг 2 раза в день	Ацетилцистеин по 600 мг 2 раза в день
Коморбидные состояния			Дистанционная консультация специалистов – коррекция лечения Кислородный концентратор (при наличии)